الصورة الكوينية

لقائمة " بيك "

لإكتئاب

د. بدر محمد الانصاري قسم علم النفس – كلية الآداب جامعة الكويت * منشور بالمجلة التربوية (1998) – مجلد 12 ، ع 46 ، ص ص 77-112، ،مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت

الصورة الكوينية لقائمة "بيك " للإكتئاب

ملخص:

تزايد الاهتمام حديثا بدراسة الاكتئاب في جميع المراحل النمائية ، ولقد حظيت قائمة "بيك " للإكتئاب (BDI-IA) المعدلة بإهتمام عالمي كبير ، حيث ترجمت إلى عدة لغات مختلفة، وقد خضعت لمراجعات عديدة ، وبذلك أصبحت خلال السبعة والعشرين عاما الأخيرة واحدة من أكثر الأدوات استخداما وقبولاً في علم النفس الإكلينيكي والطب النفسي لقياس زملات الإكتئاب لدى المجموعات السوية وغير السوية . وقد حظيت هذه القائمة بإهتمام كبير في الوطن العربي بحيث قننت في مصر والسعودية . ومن ثم هدفت هذه الدراسة إلى وضع تقنين قائمة "بيك " للإكتئاب في المجتمع الكويتي ومن ثم وضع معايير للإكتئاب تناسب فئات عمرية مختلفة من أفراد المجتمع الكويتي . وقد مر تقنين هذه القائمة بمراحل عديدة ، وتشتمل القائمة في صورتها النهائية على 12 بندا ، يجاب عن كل عبارة على أساس أربعة وتشتم القائمة بثبات مرتفع بطريقتي معامل ألفا والقسمة النصفية ، وتتصف بصدق عاملي مرتفع ، وتضم ثلاثة عوامل تسـتوعب أعراض الاكتئاب ، وتتـاح لها معايير (عاملي مرتفع ، وتضم ثلاثة عوامل تسـتوعب أعراض الاكتئاب ، وتتـاح لها معايير (طالبات ثانوي ، طالبات ثانوي ، طالبات جامعة ، موظفون ، موظفات ، مسنون ، مسنات ، مع فروق ربات بيوت) باجمالي 3775 فردا بواقع 1472 من الذكور و 2303 من الإناث ، مع فروق جوهرية بين الجنسين وبين الاعمار في بعض عينات الدراسة .

الصورة الكوينية لقائمة " بي^ك " للإكتئاب مقدمة نظرية :

يعتبر الاكتئاب مشكلة من المشكلات النفسية التي يمكن أن تعوق الفرد عن أداء دوره الاجتماعي وعن توافقه وارتقائه . والاكتئاب اضطراب له جوانب انفعالية ومعرفية وبدنية ، ويمكن أن يتمثل الاضطراب الانفعالي في الاكتئاب في عدم القدرة على الحب ، وكراهية الذات والتي قد تصل إلى التفكير في الانتحار أو الإقدام الفعلي عليه . أما الاضطراب المعرفي فيتمثل في انخفاض تقدير الذات ، وتشويه المدركات ، واضطراب الذاكرة ، وتوقع الفشل وخيبة الأمل في الحياة ، وعدم القدرة على التركيز الذهني . هذا فضلا عن الاضطراب البدني الذي يتمثل في اضطراب الشهية للطعام ، واضطراب النوم ، والعجز الجنسي ، واضطراب الجهاز العصبي المستقل ، والصداع ، والإنهاك ، وكثرة البكاء وتناقص الطاقة (بدر الانصاري 1997) .

فقد بينت الدراسات المسحية التي قام بها " هيربيست ، بايكيل " كه Herbest & بينت الدراسات المسحية التي قام بها " هيربيست ، بايكيل " كولادا 1989 على عينات من المراهقين ، أن 7ر 4% منهم يعانون من اكتئاب رئيسي و 35% يعانون من اكتئاب حاد . وقد توصل " مورجان " ورد 3% يعانون من اكتئاب رئيسي وأن 9ر 8% من المسنين يعانون من اكتئاب رئيسي وأن 9ر 8% يعانون من اكتئاب عصبي .

وفى مسح آخر قام به "بيك ، ستير " (Beck & Steer 1993) على عينات من الراشدين الأمريكان البيض (ن= 232) تبين أن 8ر95% من أفراد العينة يعانون من الاكتئاب الرئيسى ، كما تبين على عينة أخرى قوامها (98) من الذكور و(150) من الإناث أن 1ر8% من الذكور و9ر61% من الإناث يعانون من الاكتئاب الرئيسي.

وكشفت دراسة "حسن عبد اللطيف " (Abdullatif, 1995) التى أجريت على عينات من الاطفال الكويتيين من طلاب المدارس المتوسطة قوامها (1981) بواقع (995) من الذكور و(986) من الاناث أن 7ر 3% من الذكور يعانون من الاكتئاب و8ر 4% من الأناث يعانون من الاكتئاب .

كما وجد " بدر الانصارى " (1997) فى دراسة أجراها على عينات متنوعة من أفراد المجتمع الكوبتى قوامها (2135) أن أعلى معدلات انتشار الاكتئاب بين طالبات الثانوى تليها

ربات البيوت ، فالمسنون ثم طالبات الجامعة وطلبة الثانوى ثم الموظفون وطلبة الجامعة وأخيراً الموظفات والمدرسات والمدرسين . كما كشفت أيضا نتائج الدراسة عن فروق بين الجنسين في الاكتئاب لصالح الاناث أي أن الاناث أكثر اكتئابا من الذكور في جميع العينات .

ويبدو واضحا من نتائج هذه الدارسات المسحية أن نسب انتشار الاكتئاب لا تعتبر هينه في المراحل العمرية المختلفة ، كما يتضح أن الإكتئاب أكثر شيوعاً بين الاناث عنه لدى الذكور .

ويثور خلاف واسع النطاق حول مفهوم الاكتئاب وأنواعه وأسبابه ، فبعض الباحثين يرى أنه يعود إلى خلل فى كيمياء الدماغ ، على حين يرى بعضهم الآخر أنه نتيجة تناقص التدعيم الايجابي وتزايد التدعيم للأحداث المكروهة ، والذى ينتج عنه اضطراب معرفى مثل توقع الفشل والحزن واليأس ، ويرى آخرون أن الاكتئاب يعود إلى الصراع النفسي بين الأنا والأنا الأعلى ، وينظر بعضهم الآخر إلى الاكتئاب على أنه عبارة عن تدهور القدرة على الصيرورة التى يترتب عليها انخفاض فى الشعور بالوجود أى الشعور بالكينونة ، وأخيرا هناك من يرى أن الاكتئاب اضطراب وجدانى Affective disorder يرجع إلى الإدراكات المعرفية التى تحدد الاستجابة الوجدانية للفرد المكتئب ولمزيد من التفاصيل (انظر : بدر الانصارى ،

ولقد تعددت وجهات النظر إلى مفهوم الاكتئاب تعددا شديدا ، فمن الممكن أن ينظر إليه على أنه : عرض ، حالة اكلينيكية ، سلوك غير تكيفى ، استجابة شاذه للضغوط ، مظهر من مظاهر خلل الوظيفة المعرفية ، انفعال انساني سوى ، حالة مزاجية سوية ، استجابة تكيفية (أحمد عبد الخالق ،1996 : 6) .

وينظر " بيك ، ستير " (Beck & Steer, 1993) إلى الاكتئاب على أنه زملة مكونه من خمس فئات من الأعراض الوجدانية ، المعرفية ، الدافعية ، السلوكية ، تقدير الذات ، Beck Depression Inventory (BDI) بيك " للاكتئاب (BDI) مظاهر عضوية . وتعد قائمة " بيك " للاكتئاب المتخداماً وشيوعاً منذ عام 1961 وحتى الآن مع المجموعات من أكثر قوائم الاكتئاب استخداماً وشيوعاً منذ عام 1961 وحتى الآن مع المجموعات الاكلينيكية وغيرها ، والتى أجريت عليها اكثر من (1000) دراسة على مدى (36) عاما فى مختلف بلدان العالم .

ولقد حظيت قائمة " بيك " للاكتئاب باهتمام كبير على المستوى العالمي ، فترجمت عدة ترجمات في فرنسا وألمانيا والصين والفلبين وكوربا وتركيا والسوبد وكندا وإيران وأستراليا واليابان وبربطانيا وبلغاربا وقد حضيت هذه القائمة باهتمام كبير في اللغة العربية فترجمت عدة ترجمات منشورة وغير منشورة (غربب عبد الفتاح ، 1985 ؛ 1986 ؛ موسى ،1989 ؛ أحمد عبد الخالق ،1996 ؛West, 1982) . على أن بعض هذه الترجمات العربية واجهت بعض الانتقادات (انظر: أحمد عبد الخالق، 1996 :34) الا أن ترجمة أحمد عبد الخالق تعد من أفضل الترجمات العربية والتي تتميز بأنها تعتمد على الصيغة الأمربكية المعدلة والصادرة عام 1993 ، وتعربب القائمة الكاملة (21 بندا) والتأكد من تكافؤ الصيغتين الامربكية والعربية وإجراء ترجمة عكسية للبنود ، واستخدام اللغة العربية الفصحى ، وإجراء تقنيني للقائمة على عينات متعدده في مصر والسعودية ولبنان والكوبت . والجدير بالاشارة بأن الباحث ركز على العينة المصرية لحساب الثبات والصدق بوجه عام واستخرج معايير غالباً لطلاب الجامعات والثانوى لدى المصربين والسعوديين واللبنانيين والكويتيين علما بأن اجمالى العينة الكوبتية تساوى (448) فردا بواقع (123) طالبا و (325) طالبة من طلاب جامعة الكويت ، ولذلك فان هذا التقنين يعتبر تقنين مبدئي حاثا لمزبد من التقنين على عينات أخرى أكبر وأكثر تمثيلا الافراد المجتمع الكوبتي ، ومن هنا تتلخص جدوى هذه الدراسة ، والتي تهدف إلى تقنين كلي لقائمة "بيك " للاكتئاب على عينات متنوعة من أفراد المجتمع الكوبتي ومن ثم وضع معايير كوبتية لدى فئات مختلفة من أفراد المجتمع الكوبتي يمكن من خلالها عقد مقارنات بين أفراد المجتمع الكوبتي في الاكتئاب.

وضع "بيك " وزملائه (1961 , 1961) الصيغة الأولى من قائمة "بيك " للاكتئاب عام 1961 والتى تتكون من 21 بندا والتى اعتمدت على المشاهدات الاكلينيكية وعلى أوصاف الأعراض التى يعطيها بشكل متكرر المرضى بالاكتئاب فى مجال الطب النفسي فى مقابل الملاحظات والاوصاف التى يعطيها المرضى غير المكتئبين بشكل متكرر. واندمجت المشاهدات الإكلينيكية وأوصاف المرضى – بشكل متسق – فى واحد وعشرين عرضا (الحزن ، التشاؤم ، الشعور بالفشل ، عدم الرضا ، الذنب ، العقاب ، كره الذات ، اتهام الذات ، أفكار انتحارية ، البكاء ، التهيج ، الانسحاب الاجتماعي ، عدم الحسم ، تغير صورة الجسم ، صعوبة العمل ، الارق ، سرعة التعب ، فقد الشهية ، فقد الوزن ، الانشغال بالجسم، فقد

اللبيدو) يمكن تقديرها على أساس مقياس من أربع نقاط يتراوح بين صفر - 3 على أساس من اللبيدو) يمكن تقديرها على أساس مقياس من الشدة (أحمد عبد الخالق،1996 ، 1993 Beck & Steer, 1993) .

وقد بدأ "بيك " وزملاؤه في عام 1971 في مركز العلاج المعرفي باستخدام صيغة معدلة من قائمة " بيك " للاكتئاب ، بحيث حذفت الصياغات البديلة للأعراض ذاتها ، وألغى النفى المزدوج . وخفض عدد الاستجابات لكل بند إلى ثلاثة بدائل لكل عرض (فضلا عن درجــة الصفر) ، وتغيرت الصياغة الفعلية لخمسة عشر بندا ، وبقيت ستة بنود كما هي (التهيج ، البكاء ، سرعة التعب ، فقد الوزن ، فقد الشهية ، فقد اللبيدو). وقد اختبرت صيغ مبدئية عديدة . وحفظ حق النشر للمراجعة الأخيرة في عام 1978 (أحمد عبد الخالق 1996 ؛ وبهذا ظهرت صيغة مختصرة لقائمة " بيك " للاكتئاب عام 1971 (Steer & Beck 1971) . وبهذا ظهرت صيغة مختصرة لقائمة " بيك " للاكتئاب عام 1971 (1986) . (أمريكية وقد تمت ترجمتها إلى العربية (أنظر : غريب عبد الفتاح 1985) .

وظل معظم الإكلينيكيين والباحثين غير واعين نسبيا بأن هناك صيغتين ، حتى قارن "بيك، ستير" (Beck & Steer, 1993) بين الخصائص القياسية لقائمة " بيك " للاكتئاب الأصلية والمعدلة ، ووصفاهما بأنهما تقبلان المقارنة لدى المرضى في مجال الطب النفسي .

وأخيرا ظهرت الصيغة المعدلة () عام 1993 والتي تحتوى على (12بندا)، ويتكون كل بند من مجموعة من أربع عبارات تقدر من صفر - 3 . ويتراوح زمن التطبيق بين 5 :10 دقائق تقريبا . وتقيس الصيغة المعدلة "سمة " الاكتئاب على حين تقيس الصيغة الاصلية " حالة " الاكتئاب (Beck & Steer, 1993).

حللت الصيغة المعدلة من قائمة " بيك " للاكتئاب (BDI - IA) لدى عينات إكلينيكية وغير إكلينكية (أحمد عبد الخالق ،1996) ، ويعتمد العدد المستخرج من العوامل على خصائص العينات التى درست : الإكلينيكية وغير الاكلينيكية وطرق التحليل العاملى المستخدمة وعدد أفراد العينة ونوعية الثقافة وخصائص العينة . ومع ذلك فقد برهنت بعض الدراسات عن استخراج ثلاثة عوامل ترتبط معاً ارتباطاً مرتفعاً من قائمة " بيك" للإكتئاب والتى تعكس الشكاوى: المعرفية الوجدانية، والأدائية، والجسمية في أمريكا على عينات إكلينيكية وغير إكلينيكية (انظر: , Steer & Garbin, 1988; Cavanaugh & Gibbons, وغير إكلينيكية (انظر: , Steer & Garbin, 1988; Cavanaugh & Gibbons,

Byrne & Baront , وفى كندا (1983 ; Clark , Steer 1993 ; Clark et al. 1994) وفى بلغاريا (Byrne, Baron , Larsson & Melin, 1995) وفى بلغاريا (Murase, Murase, اليابان (Byrne , Baron & Balev, 1996) . Kitabatake & Yamauchi, 1995) .

على حين كشفت دراسات أخري عن استخلاص أربعة عوامل (الصعوبة في الأداء ، الاتجاه السلبي ، الإضطرابات العضوبة ، فقد الوزن والشهية) من قائمة " بيك " للإكتئاب والتي أجربت غالبيتها على عينات غير إكلينيكية في كندا (Byrne et al., 1993) وفي تركيا (Sahin & Sahin , 1995) كما كشفت دراسات أخرى عن استخلاص أربعة عوامل أخرى لقائمة " بيك " للإكتئاب ، ففي فرنسا قام" بيشوت وليمبرس " Pichot & Lemperiere عام 1964 نقلا عن " بيك " (Beck, 1967 : 203-204) بتطبيق قائمة "بيك " للاكتئاب على عينة غير إكلينيكية واستخلص منها أربعة عوامل (الاكتئاب الحيوى ، تحقير الذات ، التشاؤم - الانتحار ، عدم الحسم وإلكف) وفي الولايات المتحدة الأمربكية تمكن " بيك " (Beck, 1967) من استخلاص أربعة عوامل للقائمة على عينة غير إكلينيكية هي مقت الذات ، والاحساس بالفشل والذنب ، فقدان الشهية الى الطعام ، فقدان الوزن ، الاعاقة في العمل وسرعة الأحساس بالاجهاد ، حدة الطبع . على حين استخلص " رشاد موسى "(1989) أربعة عوامل لقائمة " بيك " للإكتئاب مصرية غير إكلينيكية أطلق عليها: التشاؤم - الحزن ، التردد وعدم الحسم ، الاحساس بالفشل - الذنب ، الأرق).، وفي الولايات المتحدة الأمربكية (Probst et,al., 1995 . كما كشفت بعض الدراسات الأخرى عن استخلاص خمسة عوامل اليأس ، الشعور بالعجز ، الاتجاه السلبي نحو الذات ، فقد الوزن والشهية ، الشكاوي العضوبة) لقائمة " بيك" للإكتتاب على عينات غير إكلينيكية في إيران (Tashakkori , Barefoot & Mehryar, 1989) ، وسبعة عوامل (الاكتئاب ، الاتجاهات السلبيه تجاه الندات ، الاضطرابات العضوبة ، الجنس وإضطراب النوم ، الانسحاب والفشل ، الأفكار الانتحاربة ومشاعر الذنب ، فقد الوزن والشهية) على عينات غير إكلينيكية في مصر (أحمد عبدالخالق 1996) للذكور والاناث . على حين استخلصت نتائج بعض الدراسات عاملان (المعرفية الوجدانيه والشكاوي الجسمية) لقائمة " بيك " للإكتئاب على عينات غير إكلينيكية في أسبانيا Salamero,Marcos, Gutierrez & Rebul, 1994) وفي كندا على عينات إكلينيكية وغير إكلينيكية (Clark, Steer & Beck, 1994) وفي الولايات المتحدة الأمربكية على عينات غير إكلينيكية (Catanzaro, 1994)، وعاملاً وإحداً (الاكتئاب) من عينة إكلينيكية أمربكية (Pulos, 1996).

وفي ضوء التراث السيكولوجي المتعلق بالتركيب العاملي لقائمة " بيك " للإكتئاب، يبدو لنا أن الجدل غير محسوم على الرغم من نجاح عدد كبير من الباحثين في استخلاص ثلاثة عوامل لقائمة "بيك " للإكتئاب برغم أختلاف العينات والثقافات وربما تتفق هذه النتائج مع نظرية " بيك " في الإكتئاب (النظرية المعرفية) والتي ترى بأن الاكتئاب يحدث نتيجة إلى النظرة السلبية للفرد إلى ذاتة وإلى العالم وبالتالى المستقبل. وهذه النظرة التشاؤمية للذات والمستقبل والعالم يطلق عليها الثالوث المعرفي السلبي للإكتئاب (1987; 1983; 1987) (Clark & Beck & Freeman 1990 وجميع أعراض الاكتئاب الوجدانية والسلوكية والدافعية والبدنية ينظر إليها على أنها نتيجة مباشرة لذلك التنظيم أو الثالوث المعرفي السلبي . ومع ذلك فالرأى لدينا أن قائمة " بيك " للاكتئاب تقيس أعراض متعددة للاكتئاب (وجدانية ، سلوكية ، معرفية ، فسيولوجية) ومن الطبيعي تتجمع مثل هذه الاعراض تحت أكثر من عامل وهذا ما تحقق من نتائج الدراسات السابقة . وفي ضوء هذه المنظورات النظرية ، يفترض الباحث الحالى أن البنية العاملية لقائمة " بيك " للإكتئاب تنتظم في ثلاثة عوامل في المجتع الكوبتي ، علما بأنه لم يصل إلى علم الباحث دراسة كوبتية منشورة أجربت التخطيط ذاته . والرأى المؤكد إلى حد بعيد أن قائمة " بيك " للإكتئاب تعد – في المقام الأول – مقياساً لأعراض الاكتئاب ، والتي يمكن أن تتجمع معاً في شكل زملة الاكتئاب . وفيما يختص بالصورة العربية لقائمة " بيك " للاكتئاب المعدلة من إعداد " أحمد عبد الخالق "(1996) يرى الباحث أنها تتمتع بخواص سيكومتربة جيدة وفقاً للثقافة المصربة . ومن ثم إطلع كاتب الباحث الحالى بفحص القائمة على فئات متنوعة من أفراد المجتمع الكوبتي وذلك للتحقق من معالمها السيكومتربة الخاصة بالثبات والصدق وفحص بنيتها العاملية ومن ثم استخراج معايير كوبتية تسمح بالمقارنة بين أفراد المجتمع الكوبتي في الإكتئاب النفسي. والميزة الأساسية للمقاييس المعربة إمكان عقد المقاربات بين الثقافات المختلفة ، اذ يستحيل عقد مثل هذه المقاربات ما لم يكن المقياس المستخدم وإحداً.

اعداد الصورة الكويتية لقائمة " بيك " للاكتئاب

يعرض هذا القسم لاجراءات اعداد الصورة الكويتية لقائمة " بيك " للاكتئاب ، ويشمل وصفا عاما لترجمة بنود القائمة ، تحليل البنود ، التحليل العاملي للبنود ، الثبات ، الصدق .

أولا: ترجمة البنود:

قام الباحث الحالى بإستخدام الصيغة العربية لقائمة " بيك " المعدلة للاكتئاب من تعربب " أحمد عبد الخالق " (1996) والتي تعتمد على الصيغة الأمربكية المعدلة والمنشورة عام 1978 والواردة في دليل التعليمات الصادر عام 1993 والتي تحتوي على 21 مجموعة من العبارات ، تضم كل مجموعة أربعة احتمالات ، فتكون القائمة مشتملة على 84 عبارة . وقد ترجمت بنود القائمة وتعليماتها ترجمة عكسية إلى العربية بتصريح من " آرون بيك " ، ثم خضعت الترجمة لمراجعات عديدة من قبل المتخصصين في علم النفس وفي اللغة الانجليزية . استخدم اللغة العربية الفصحي السهلة في القائمة المعربة وذلك حتى تناسب كل المتعلمين العرب تقريبا (أحمد عبد الخالق، 1996 : 35) . ولم يجرى الباحث أي تعديل (حذفا أو إضافة) بالنسبة لعدد البنود أو مضمونها في القائمة ، فأبقى على عددها (21بندا) ، وذلك لاتاحة الفرصة للباحثين لاجراء بحوث مقارنة ، والاستفادة من نتائج الدراسات العالمية المتوافرة على المقاييس الأربعة في لغتها الأصلية ، وحتى تكون المقاربات المختلفة ممكنه بالنسبة للبنود والقائمة ككل ، فضلا عن ان تعديل البنود قد يثير مشكلات عديدة (انظر: أحمد عبد الخالق، 1993: 106). وإكل ذلك فالترجمة في هذه الحال أفضل من التأليف، بشرط الاستمرار في اجراءات تقنين المقاييس ، ذلك ان البدء من حيث انتهى الآخرون قد يكون أفضل من البدء من نقطة الصفر . وقد وضعت تعليمات تطبيق القائمة مختصرة وبسيطة، وتحدد للمفحوص مباشرة المطلوب منه عند الاجابة ، وفيما يلى نص التعليمات :

"يشتمل هذا الاستفتاء على 21 مجموعة من العبارات . بعد أن تقرأ كل مجموعة منها بامعان ، ضع دائرة حول أحد الأرقام (صفر ،1،2،3) التي تسبق العبارة التي تصف تماما الحالة التي كنت تشعر بها خلال الأسبوع الماضي ، بما في ذلك اليوم الحالي . وإذا رأيت أن عدة عبارات في مجموعة واحدة تنطبق عليك بالدرجة نفسها فضع دائرة حول كل رقم يقابلها . تأكد من قراءة كل العبارات في كل مجموعة قبل أن يقع اختيارك على إحداها ".

وتصحح قائمة بيك للاكتئاب بجمع التقديرات التي يعطيها المفحوص لكل من الواحد والعشرين بندا ، ويتكون كل بند من مجموعة من أربع عبارات تقدر من صفر - 3 . والدرجة الكلية القصوى هي 63 . وإذا اختار المفحوص أكثر من عبارة واحدة داخل المجموعة استخدم العبارة ذات التقدير الأعلى لحساب الدرجة . ويجب أن نوجه اهتماما خاصا عند وضع الدرجة للبند 19 الخاص بفقد الوزن ، فإذا ذكر المفحوص أنه يحاول - شعوريا - أن ينقص وزنه ، عندئذ لايضاف تقدير هذا البند للدرجة الكلية (أحمد عبد الخالق 1996 : 13) .

ثانيا : تحليل البنود :

يستخدم تحليل البنود كاجراء احصائي لعزل أنواع معينه من البنود أو حذفها ، وبخاصة تلك التى لا تضيف إلى الدرجة الكلية بما فيه الكفايه ، ويتم ذلك عن طريق حساب معاملات الارتباط بين كل بند والدرجة الكلية على المقياس ، إذ تحذف البنود ذات الارتباطات المنخفضة .

طبقت قائمة "بيك "للإكتئاب على عينة كويتية قوامها (1744) فردا بواقع (707) من الذكور و (1037) من الاناث بواقع ور27% ومن طلاب الثانوي و 3ر 27% من طلاب الجامعة و 4ر 39% من الموظفين و 8ر 2% من المسنين و 8ر 3% من ربات البيوت ، ممن تتراوح أعمارهم بين 14–76 عاما ، بمتوسط حسابي قدره و 5ر 26 ، وانحراف معياري قدرة 10ر 10. وحسب معامل ارتباط بيرسون للدرجات الخام بين كل بند والدرجة الكلية بعد التصحيح لبنود قائمة "بيك " في صيغتها العربية . واستخرجت مستوى الدلالة الاحصائية المقابلة لدرجات الحرية بالنسبةللعينات الخمسة التالية (طلاب الثانوي ، طلاب الجامعة ، الموظفون ، المسنون ، ربات البيوت) (انظر : جدول 1) .

جدول (1) معاملات الارتباط بين كل بند والدرجة الكلية بعد التصحيح لبنود قائمة " بيك " للإكتئاب

ربات بيوت	مسنون	موظفون	طلاب جامعة	طلاب ثانوی	بنود القائمة	م
(ن=157)	(ن=142)	(ن=1409)	(ن=938)	(ن=1129)		
40ر	53ر 0	59ر 0	52ر 0	55ر 0	الحزن	1
49ر 0	69ر 0	57ر 0	0,46	51ر 0	التشاؤم	3
28ر 0	66ر 0	59ر 0	61ر 0	52ر 0	الشعور بالفشل	4
49ر 0	54ر 0	0,49	51ر 0	52ر 0	عدم الرضا	5 6
46ر 0	65ر 0	0,49	0,49	48ر 0	الذنب	7
41ر 0	0,46	51ر 0	47ر 0	51ر 0	العقاب	8 9
44ر 0	67ر 0	61ر 0	52ر 0	51ر 0	كره الذات	10
98ر 0	56ر 0	0,43	0,43	45ر 0	اتهام الذات	11 12
67ر 0	58ر 0	50ر 0	0,49	48ر 0	أفكار انتحارية	13
45ر 0	50ر 0	0,49	0,41	45ر 0	البكاء	14 15
45ر 0	65ر 0	0,41	0,40	98ر 0	التهيج	16
44ر 0	86ر 0	54ر 0	0,48	45ر 0	الانسحاب الاجتماعي	17
53ر 0	66ر 0	51ر 0	58ر 0	98ر 0	عدم الحسم	18 19
38ر 0	72ر 0	0,48	0,45	46ر 0	تغير صورة الجسم	20
47ر	66ر 0	53ر 0	58ر 0	52ر 0	صعوبة العمل	21
50ر 0	67ر 0	0,46	0,39	42ر 0	الارق	
62ر 0	63ر 0	52ر 0	58ر 0	0,45	سرعة التعب	
46ر 0	63ر 0	50ر 0	0,45	47ر 0	فقد الشهيه	
28ر 0	48ر 0	36ر 0	31ر0	37ر 0	فقد الوزن	
36ر 0	0,49	41ر 0	0,36	0,42	الانشغال بالجسم	
29ر 0	26ر 0	0,44	0,34	0,32	فقد اللبيدو	

^{*} جميع معاملات الارتباط جوهرية عند مستوى (001ر0) لدى جميع العينات .

يتضح من جدول (1) أن جميع بنود القائمة ارتبطت جوهريا عند مستوى 0000 وهو أعلى مستوى للدلالة الاحصائية حيث تراوحت معاملات الارتباط بين البند الواحد والدرجة الكلية بعد التصحيح لبنود قائمة " بيك " للاكتئاب بين 0000 و 0000 لعينة الذكور وبين 0000 و 0000 لعينة الاناث وبين 0000 و 0000 للعينة الكلية ، وجميعها دالة عند مستوى 0000 مما يشير إلى تجانس بنود القائمة وبالتالي تم الاحتفاظ بجميع البنود دون حذف أى بند واحد منها .

ثالثاً : التحليل العاملي :

يستخدم التحليل العاملى بهدف التعرف إلى مجموعات البنود التى ترتبط بدرجة كبيرة بعضها مع بعض ، ولكنها ترتبط بدرجة منخفضة أو لا ترتبط تماماً مع مجموعات أخرى من البنود . وتجدر الاشارة هنا إلى أن الارتباطات التى تحسب فى هذه الطريقة تكون بين البنود والمفرده وليس الدرجة على القائمة الكلية . لذلك استخرجت معاملات الارتباط المتبادلة بين بنود القائمة على حده وحللت عامليا بطريقة " هوتيلنج : " المكونات الاساسية، واستخدم محك "جتمان " الحدود الدنيا ، وذلك لتحديد عدد العوامل بحيث يعد العامل جوهرياً اذا كانت قيمة الجذر الكامن . >0ر 1 . ثم أديرت العوامل المستخرجة تدويراً متعامداً بطريقة " كايزر : " الفاريماكس . حيث يمكن اعتبار التشبع الجوهري للبند بالعامل بأنه >040 على ان تكون هناك ثلاثة تشبعات جوهرية لكل عامل على الأقل بالإضافة إلى محك الجذر الكامن للعامل > 1.00

جدول (2) العوامل المتعامده المستخرجة من استجابات عينة طلاب الجامعة وعينة الموظفون والشيوع (هـ2) والجذر الكامن ونسبة التباين لقائمة "بيك " للاكتئاب

	(1409	ن(ن=	موظفو			(938	معة (ن=	طلاب الجاه	1	البنود	م
2-&	ع4	ع3	ع2	ع1	2-&	ع4	ع3	ع2	ع1		
ر 50				64ر0	45ر0				42ر0	الحزن	1
J55				70ر	55ر0				75ر0	التشاؤم	2
J56				70ر	0ر0				51ر0	الشعور بالقشل	3
ر39				49ر0	45ر0				51ر0	عدم الرضا	4 5
J63		74ر			42ر0		41ر0		0,40	الذنب	
J63		73ر			37د0				50ر0	العقاب	6
ر59		46ر		56ر0	65ر0				77ر0	كره الذات	7
39ر		ر 52			93ر0			45ر0	35ر0	اتهام الذات	8
J56			ر 43	46ر0	50ر0				59ر0	أفكار أنتحارية	9
26ر				44ر0	51ر0	37د0		95ر0		البكاء	10
ر 25				35ر0	45ر0			61ر0		التهيج	11
42ر				56ر0	93ر0			54ر0		الانسحاب لاجتماعي	12
كر 45				ر60 کار	52ر0			51ر0		عدم الحسم	13
41ر				95ر0	34د0			46ر0		تغير صورة الجسم	14
59ر	64ر0			41ر0	51ر0		44ر0	51ر0		صعوبة العمل	15
J55	67ر0				32ر 0		41ر0			الارق	16
J61	67د0				51ر0		52ر0			سرعة التعب	17
J 53	41ر0		J56		62ر0	70ر				فقد الشهيه	18
48ر			J65		59ر0	75ر0	0.4			فقد الوزن	19
J45			J62		54ر0		0,65			الانشغال بالجسم	20 21
ر 44ر			J57		47ر0		56ر0			فقد اللبيدو	21
	20ر 1	1ر1	1,45	67د6		08ر1	32ر 1	1,36	17ر6	الجذر الكامن	
	8ر4	5,3	ور6	31,8		1ر5	23ر 6	6,5	4ر29	نسبة التباين	
	%	8ر48	0				کر 47%	30		بة التباين الكلى	نسب

من النظر إلى جدول (2) نلاحظ تشبعات جميع بنود قائمة "بيك " للاكتئاب فى أربعة عوامل متعامدة لدى الموظفون . ففى عينة طلاب الجامعة ، يلاحظ ان جميع العوامل المستخرجة عبارة عن عوامل أحادية القطب حيث احتوت على تشبعات جوهرية موجبة فقط ، وقد تم تفسير هذه العوامل نفسيا تبعا للتشبعات البارزة فى بنود قائمة " بيك "(انظر : جدول 3) . وتشبعت جميع بنود القائمة جوهريا بأحد العوامل المستخرجة ماعدا البنود رقم (58،10،15) التى لها تشبعات جوهرية على عاملين ، وقد يرجع ذلك إلى تداخل أعراض الاكتئاب بوجه عام ، وافتراض وجود عامل عام يستوعبها .

وفى عينة الموظفون ، أمكن استخلاص أربعة عوامل متعامدة وأحاديه القطب ، والتى استوعبت 80ر 48% من التباين الكلى ، علما بأن جميع بنود القائمة تشبعت جوهريا بأحد العوامل ماعدا البنود رقم (7،9،15،18) والتى لها تشبعات جوهرية على عاملين ، وقد يرجع ذلك إلى تداخل أعراض الاكتئاب ، كما سبق الاشارة إلى ذلك فى الفقرة السابقة . وقد تم

تفسير عوامل الموظفون تفسيرا نفسيا وفقا لتشبعات البنود البارزة في القائمه (أنظر جدول 3).

جدول (3) أسماء العوامل المستخرجة من بنود قائمة " بيك " للاكتئاب لدى عينة طلاب الجامعة وعينة الموظفون

	لفون	عوامل الموظ		عوامل طلاب الجامعة					
4	3	2	1	4	3	2	1		
الصعوبة في الاداء	الشكاوى الجسمية	الشكاو ي الجسمية	الاكئتاب	الشكاوى الجسمية	الصعوبة في الاداء	الاتجاهاتالسلبية تجاه الذات	كتئاب		
الأرق سرعة التعب صعوبة العمل فقد الشهية	الذنب العقاب اتهام الذات كره الذات	فقد الوزن الانشغال بالجسم فقد اللبيدو فقد الشهيه فقد الشهيه افكار انتحاريه	الشعور بالفشل التشاؤم الحزن عدم الحسم عدم الحسم تغير صورة الجسم الاستحاب الاجتماعي عدم الرضا افكار انتحارية صعوبة العمل النهيج	فقد الوزن فقد الشهيه البكاء	الانشغال بالحسم فقد اللبيدو سرعة التعب صعوبة العمل الأرق الذنب	التهيج البكاء الإنسحاب الاجتماعي صعوبة العمل عدم الحسم تغير صورة الجسم اتهام الذات	الذات شاوم ر بالفشل الرضا عقاب حزن ذنب م الذات		

هذا وبالنظر إلى عوامل طلاب الجامعة وعوامل الموظفون يلاحظ أن هناك تشابها الاسم والمضمون للعوامل الأربعة ، حيث يتطابق العامل الأول لطلاب الجامعة مع العامل الأول للموظفون وهو عامل الاكتئاب ، كما يتشابه العامل الثاني لطلاب الجامعة بالعامل الثالث للموظفون ، ويسمى هذا العامل بالاتجاهات السلبية تجاه الذات ، وإن كانت التشبعات تختلف في الدرجة لدى الجنسين ولكن يتفقا في المضمون ، أما العامل الثالث لطلاب الجامعة فيتشابه مع العامل الرابع لدى الموظفون وقد أطلقنا عليه عامل الصعوبة في الاداء . اما العامل الرابع لطلاب الجامعة فيتشابه مع العامل الثاني للموظفون وقد أطلقنا عليه عامل الشكوى الجسمية . ولاشك في أن هذه النتيجة تكشف عن التشابه في التصور العام للبناء العاملي لاعراض الاكتئاب لدى كل طلاب الجامعة والموظفون والتي قد ترجع إلى تشابه الظروف الاجتماعية وأحداث الحياة الضاغطة بالنسبة لطلاب الجامعة والموظفون . ويحتاج المتعامدة (مصفوفة عوامل طلاب الجامعة ومصفوفة عوامل الموظفون) الموضحين بالجدول رقم (2) لاستخراج مصفوفتي قيم جيوب التمام بين العوامل والتي تعتبر تقديرا للارتباط بينهما أو التشابهية بينهما (انظر: صفوت فرج ، 1991 : 30) وهذه المقارنة بالطبع تحتاج إلى دراسة مستقلة قائمه بذاتها .

وفى العينة الكلية ، أمكن استخلاص ثلاثة عوامل أحادية القطب ، والتى استوعبت الر42% من التباين الكلى ، علما بأن جميع بنود القائمة تشبعت جوهريا بأحد العوامل المستخرجة ، علما بأن هناك بندان لهما تشبعات على عاملين (ارقام: 16،17) وتشبع هذين البندين على عاملين أمر متوقع نتيجة تداخل أعراض الاكتئاب ، وهي جميعا منبهات مثيرة للاكتئاب ، وافتراض وجود عامل عام يستوعبها جميعا (انظر :جدول 4).

وبتضح أيضا من الجدول رقم (2) قيم شيوع البنود (مجموع مربعات تشبعات البند على جميع العوامل المستخلصة في المصفوفة لمجموعة الذكور ومجموعة الاناث) وجدول رقم (4) للعينة الكلية وقد تراوحت بين 35ر0 ، 66ر0 للذكور وبين 27ر0 ، 64ر0 للاناث وبين 29ر 0 ، 63ر 0 للعينه الكلية . وعلى أي الأحوال فانه يمكن النظر إلى قيم الشيوع للبند في مصفوفة عاملية باعتبارها معامل ثبات لهذا البند حيث تمثل قيم الشيوع في هذه الحالة هذا التباين الحقيقي الذي استخلص معبرا عن تباينات مختلفه يشترك فيها البند مع غيره من البنود طالما بقى تباين الخطأ فى مصفوفة البواقي معبرا بدورة عن الجزء من التباين الكلى الذي لا يشترك فيه المقياس مع غيره من البنود نتيجة لاخطاء القياس (صفوت فرج، 1991: 148) . وبوجه عام يلاحظ أن قيم الشيوع تتراوح ما بين منخفض ومقبول ومرتفع لدى المجموعات الثلاثة (الذكور ، الإناث ، الكلية) وبمكن تفسير ذلك في ضوء انخفاض ثبات البنود على المصفوفه العاملية نتيجة لتداخل أعراض الإكتئاب وعدم تجانس عينات البحث في السن والجنس. وتراوحت قيم الجذر الكامن (مجموع مرسعات تشبعات كل البنود على كل عامل على حده ، من عوامل المصفوفة) بين 83ر6 ، 50ر1 لعينة الذكور وبين 27ر 6 ، 12ر 1 نعينة الاناث وبين 48ر 6 ، 04ر 1 للعينة الكلية، ووصلت النسبة الكلية للعوامل جميعا إلى 1ر49% لعينة الذكور و5ر41 لعينة الاناث و 1ر42% للعينة الكلية ، وهي تشير إلى أن العوامل المستخرجة تكفي إلى حد ما لاستيعاب قدر مقبول من التباين. وربما يعود انخفاض التباين الكلى للعوامل نتيجة لعدم تجانس العينات بقـــدر كاف في العدد وفي بعض المغيرات (السن ، الجنس ، المستوى التعليمي والاجتماعي ... الخ) . ويجب على الباحث أن يتحكم بأكبر قدر في هذه المتغيرات بما يؤدي إلى زبادة التباين الكلي وبالتالي خفض حجم التباين الذي يكون مصدره الخطأ . و تباين الخطأ وهو القدر من التباين الذي لا يستخلص عامليا وبتبقى في المصفوفه الارتباطيه بعد استخلاص العوامل المختلفة في شكل بقايا (صفوت فرج ، 1991 :144) .

جدول (4)
العوامل المتعامدة المستخرجة من استجابات العينه الكلية
(ن=3775) والشيوع (هـ2) والجذر الكامن ونسبة التباين لقائمة " بيك " للاكتئاب

الشيوع	العامل الثالث	العامل الثاني	العامل الأول	مضمون البند	3
46ر0			62ر0	الحزن	1
49ر 0			67ر0	التشاؤم	2
50ر0			66ر0	الشعور بالفشل	3
36ر0			50ر0	عدم الرضا	4
34د0			47د(0	الذنب	5
37د0			53ر0	العقاب	6
55ر0			72ر	كره الذات	7
32ر0		46ر		اتهام الذات	8
43ر0			62ر0	أفكار انتحارية	9
29ر 0			40ر	البكاء	10
31ر0		52ر0		التهيج	11
38ر 0		50ر0		الانسحاب الاجتماعي	12
51ر0		61ر0		عدم الحسم	13
30ر0			40ر	تغير صورة الجسم	14
49ر		61ر0		صعوبة العمل	15
42ر0	46ر	45ر0		الأرق	16
52ر0	42د0	57ر0		سرعة التعب	17
62ر0	73د0			فقد الشهيه	18\
0,63	77ر			فقد الوزن	19
27ر	40د			الانشغال بالجسم	20
28ر		46ر		فقد اللبيدو	21
ر1	04	1ر32	48ر	الجذر الكامن	
ور4	00	30ر	90ر 30	نسبة التباين	
	% 41	10ر		بة التباين الكلي	نس

وتم تفسير عوامل العينة الكلية تفسيراً نفسياً تبعا للتشبعات الجوهرية للبنود المندرجة تحت كل عامل كما هو موضح في جدول رقم (5)، وهي تفسر تقريبا تطابق الاسم والمضمون مع العوامل المستخرجة من عينة الاناث وربما يرجع ذلك إلى حجم عينة الاناث السذى يزيد عن عينة الذكور بحوالي 831 فردا وبالتالي فان الصيغة الغالبة للعينة الكلية

تتأثر إلى حد كبير بعينة الاناث . وبوجه عام فإن نتائج التحليل العاملي للعينة الكلية تتسق مع نتائج العديد من الدراسات , Cavanaugh & Gibbons, 1983; Huba, 1984; Beck ، Beck & Steer & Garbin, 1988; Beck & Steer, 1993; Clark et al., 1994; Byrone, Baron, Larson & Melin, 1995; Murase, Sanako, Muras, Kitabatake & Jamauchi, 1995; Byrne, Baron & Balev, 1996) التى كشفت عن ثلاثة عوامل الشكاوى المعرفية الوجدانية والخاصة بالاتجاهات السلبية تجاه الذات ، والادائية أى الصعوبة في الاداء ، والجسمية . وبذلك تقدم هذه الدراسة نتيجة إضافية لقابلية العوامل الثلاثة المستخرجة من قائمة "بيك " للاكتئاب للتكرار عبر ثقافات شرقية .

جدول (5) أسماء العوامل المستخرجة من بنود قائمة " بيك " للإكتئاب لدى العينة الكلية

3	2	1
الشكاوى الجسمية	الصعوبة في الاداء	الاتجاهات السلبية نحو الذات
فقد الوزن	صعوبة العمل	كره الذات
فقد الشهيه	عدم الحسم	التشاؤم
الأرق	سرعة التعب	الشعور بالفشل
سرعة التعب	التهيج	الحزن
الانشىغال بالجسم	الانسحاب الاجتماعي	أفكار انتحارية
	اتهام الذات	العقاب
	فقد اللبيدو	عدم الرضا
	الأرق	الذنب
		البكاء
		تغير صورة الجسم

وبوجه عام ، تشير العوامل الثلاثة المستخرجة من بنود قائمة " بيك " للاكتئاب للكويتيين إلى تجمعات أعراض أو زملات مهمة في مجال الاكتئاب : الاتجاهات السلبيه تجاه الذات ، والصعوبات في الاداء ، والشكاوى الجسمية . ويتفق ذلك – في كثير من الجوانب – مع العديد من التحليلات العامليه للقائمة كما سبق الإشارة إليه . ويدلل – من ناحية أخرى – على صدق عاملي لقائمة " بيك " للاكتئاب في المجتمع الكويتي .

ويرى الباحث الاكتفاء بهذا التعليق على نتيجة هذا التحليل - سواء أكان على مستوى العوامل أم البنود - مرعاة لحدود هذه الدراسة ، حيث يمكن التوسع في استخلاص

دلالات النتائج العاملية من هذه القائمة الخصبه فى دراسات تالية يكون من بين أهدافها اجراء تدوير مائل وتحليل عاملي من الرتبة الأولى والرتبة الثانية لكل مجموعة من مجموعات الدراسة (طلاب ثانوى ، طلاب جامعة ، موظفون ، مسنون ، ربات بيوت).

رابعاً : الثبات :

اعتمد الباحث في حساب ثبات المقياس على طريقة معاملات ألفا من وضع كرونباخ بعد تطبيق واحده ولصيغه واحده للقائمة ، وذلك لبيان مدى الاتساق في الاستجابات لجميع بنود القائمة . ولذلك يعطى معامل ألفا درجة " إتساق مابين البنود " وكذلك تم حساب ثبات الاتساق الداخلي بطريقة القسمة النصفية بعد تطبيق واحد ولصيغة واحدة في القائمة ويمدنا هذا النوع من الثبات بمقياس لاتساق عينات محتوى القائمة على ثلاثة مجموعات : الذكور ، الاناث ، العينة الكلية كما هو موضح في جدول (6) .

جدول (6) معاملات الثبات لقائمة " بيك " للإكتئاب

ربات بیوت	مسنون	موظفون	طلاب	طلاب ثانوی	طرق حساب الثبات
(ن=157)	(ن=142)	(ن=1409)	جامعة	(ن=1129)	
	,	, ,	(ن=983)	,	
84ر 0	92ر 0	89ر 0	87ر 0	87ر 0	معامل ألفا
72ر 0	87ر0	83ر 0	0,81	80ر 0	القسمه النصفيه (معامل
	_	_	-	J	سبيرمان -براون)

ويتضح من الجدول رقم (6) ارتفاع معاملات ثبات ألفا وثبات القسمة النصفية لدى المجموعات الثلاث مما يشير إلى اتساق داخلى مرتفع للقائمة ، ومن ثم تعد معاملات الثبات بطريقة ألفا وبطريقة القسمة النصفية مقبولة بوجه عام على ضوء تصميم هذه الدراسة .

ويمكن أن يفسر أى معامل ثبات بشكل مباشر على ضوء النسبة المئوية لتباين الدرجة التى تعزى إلى المصادر المختلفة ، ومن ثم فان معامل ثبات 85ر0 يعنى أن 85% من التباين فى درجات القائمة يعتمد على التباين الحقيقى فى المتغير المراد قياسه ، وأن 15% يعتمد على تباين الخطأ . وبوجه عام يعد معامل الثبات الذى يساوى أو يزيد عن 70و0 مقبولا فى مقاييس الشخصية (انظر: أحمد عبد الخالق ، 1996: 50-51) وبالتالي فإن معاملات الثبات المستخرجة من قائمة " بيك " للاكتئاب تعتبر مقبولة للمجموعات الخمسة (طلاب ثانوى ، طلاب جامعة ، موظفون ، مسنون ، ربات بيوت).

خامسا : الصدق :

يشير الصدق إلى مدى صلاحية المقياس وصحته في قياس ما يعلن أنه يقيس ، وهناك ثلاثة طرق أساسية حددتها " معايير القياس التربوى والنفسي الصادرة عن " الرابطة الامريكية لعلم النفس " عام 1985 ، ويذكرها " أحمد عبد الخالق " (1993 : 183) كما يلى : صدق المحتوى والصدق المرتبط بالمحك ، وصدق التكوين . وسوف نركز على الأخير في حسابنا لصدق قائمة " بيك " للاكتئاب . ويعد صدق التكوين وسوف الكوين النسبة للاختبار ، ما هو محاولة للاجابة عن السؤال التالى : إلى أى حد يمكن ان يعد الاختبار مقياسا لتكوين نظرى أو سمة ؟ وهناك طرق لحساب صدق التكوين أهمها : التحليل العاملى (الصدق العاملي) والارتباطات مع اختبارات أخرى (الصدق التقاربي والاختلافي).

وتشير العوامل الثلاثة المستخرجة من العينة الكلية لبنود قائمة " بيك " للإكتئاب إلى تجمعات أعراض مهمة في مجال الاكتئاب : الاتجاهات السلبيه تجاه الذات (الاعراض المعرفية الوجدانية) ، والصعوبة في الاداء (الأعراض الأدائية) ، والشكاوى الجسمية (الأعراض الجسمية أو العضوية) . ويتفق ذلك – كما سبق الإشارة إليه – في كثير من الجوانب – مع العديد من التحليلات العاملية العالمية لقائمة بيك للإكتئاب . ويدلل – من ناحية أخرى – على صدق عاملي للقائمه . ومن ناحية ثانية تم حساب الصدق التقاربي والاختلافي وذلك من خلال حساب " الارتباطات المتبادلة بين قائمة " بيك " للاكتئاب من ناحية ومقاييس مختلفة البناء ومتفرعة من مقياس الانفعالات المميزة من الككتئاب من ناحية (Izard (D E S) وتعريب الباحث الحالي ، ويقيس ما يلي : (Dougherty, Bloxom & Kotsch, 1974) الانشغال ، البهجه ، الدهشة ، الضيق، الاشمئزاز ، الغضب ، الذنب ، الخجل . ويتمتع المقياس بخصائص سيكومترية جيده وذلك تبعا للمعايير الأمريكية (, 1994).

جدول (7) معاملات الارتباط بين قائمة " بيك " للاكتئاب ودليل الانفعالات المميزة (DES)

,	<u>′</u>				
ربات بيوت	مسنون	موظفون	طلاب الجامعة	طلاب الثانوي	
(ن=157)	(ن=142)	(ن=1409)	(ن=938)	(ن=1129)	
					المقاييس
الارتباط	الارتباط	الارتباط	الارتباط	الارتباط	
بقائمة"بيك"	بقائمة"بيك	بقائمة"بيك"	بقائمة"بيك"	بقائمة"بيك"	
0,31	36ر 0	50ر 0	53ر 0	42ر 0	الغضب
-35ر0	-59ر	-28ر 0	-55ر 0	-23ر 0	الانشغال
0,48-	65ر 0	-42ر	-48ر 0	-98ر 0	البهجة
0,31	25ر 0	31ر 0	29ر 0	22ر 0	الدهشة
53ر 0	58ر 0	63ر 0	64ر 0	55ر 0	الضيق(الكرب)
0,39	48ر 0	49ر 0	51ر 0	44ر 0	الاشمئزاز
52ر 0	88ر 0	53ر 0	54ر 0	45ر 0	الذنب
* 25ر 0	32ر 0	30ر 0	36ر 0	27ر 0	الخجل
0,40	47ر 0	51ر 0	55ر 0	37ر 0	الخوف
* 29ر 0	33ر 0	49ر 0	35ر 0	28ر 0	الازدراء

^{*} جميع معاملات الارتباط جوهرية عند مستوى 0ر 0 ماعدا (*) جوهرية عند مستوى 0ر 0.

يبين جدول (7) معاملات الارتباط المتبادلة بين قائمة " بيك " للإكتئاب والمقاييس المتفرعة من مقياس الانفعالات المميزة . وتعد جميع هذه المعاملات إضافة إلى صدق التكوين لقائمة "بيك " للاكتئاب بوجه عام ، والإرتباطات بينها جوهرية وموجبة وكل من: " الضيق، الذنب ، الاشمئزاز ، الخوف ، الغضب ، الازدراء ، الخجل ، الدهشة . ولكن ارتباط قائمة "بيك" للاكتئاب بمقياس الانشغال والبهجة جوهرى سلبى ، وجميع الارتباطات الجوهرية الايجابية والسلبية تشير إلى أن مفهوم الاكتئاب والمفاهيم الاخرى مستقلة برغم تداخلها المحدود .

سادسا: المعايير:

اعتمد الباحث الحالى على المتوسطات الحسابيه والانحرافات المعيارية والمئينيات بوصفها معايير لقائمة "بيك" للاكتئاب في صورتها الكوبتية ، وقد اشتقت هذه المعايير من

عينة التقنين وقوامها (3775) فرداً بواقع (1472) من الذكور و(2303) من الاناث وهي العينه التي حسب على أساسها ثبات وصدق القائمة .

أولا: المتوسطات والانحرافات المعيارية :

يبين جدول (8) المتوسطات الحسابيه والانحرفات المعياريه لقائمة " بيك " في خمس مجموعات مستقلة .

جدول (8) المتوسطات الحسابية (م) والانحرافات المعياريه (ع) لقائمة "بيك" للاكتئاب وللاعمار لدى عينات كوبتية

		اناث								
ئاب	וצצי	مر	العا	ن	الإكتئاب		العمر		ن	العينات
ع	م	ع	م		ع	م	ع	م		
10,42	28ر 17	1,88	78ر 17	779	11,25	18,36	2,61	17,31	350	طلاب ثانوی
72ر 9	83ر 15	3,40	22,42	632	22ر 9	13ر 13	5,69	24,37	306	طلاب جامعة
7,99	11,03	02ر6	29ر 30	715	77ر 10	67ر 13	55ر 8	77ر 30	694	موظفون
37ر 14	57ر 18	5,90	00ر 48	40	11,15	15,88	78ر 8	57,32	102	مسنون
88,8	27ر 16	11,88	39,40	157	-	_	-	-	_	ربات بيوت

وبالنظر إلى جدول (8) ، يلاحظ بوجه عام ارتفاع متوسطات طلاب الثانوى من الجنسين في الاكتتاب عن طلاب الجامعة والموظفين من ناحية ، ومن ناحية أخرى يلاحظ ارتفاع متوسطات الاكتئاب لدى المسنين عن الموظفين مما يؤكد حقيقة مؤداها أن الاكتئاب يتأثر بالعمر .

ثانيا : المئينيات :

يعرف المئين أو الدرجة المئينية ، بأنه نقطة محددة على امتداد توزيع محوله فيه التكرارات إلى نسبة مئوية من المجموع الكلى للحالات ، ويحدد المئين النسبة المئوية للحالات التى تقع بعد درجة معينة ، فيعنى المئين 25 مثلا أن الفرد الذى حصل عليها قد حصل على درجة تزيد على الدرجة التى حصل عليها ربع عينة التقنين . ويعنى المئين 50 أن الدرجة التى حصل عليها الفرد أعلى من درجة 50% من أفراد عينة التقنين ، أما المئين 75 فيعنى أنه يزيد على الدرجة التى حصل عليها ثلاثة أرباع الأفراد في عينة التقنين ، يبين جدول (9) الرتب المئينية المقابلة للدرجات الخام (الدرجة الكلية) لقائمة "بيك " للإكتئاب لدى تسع عينات كويتية .

جدول (9) الرتب المئينية المقابلة للدرجات الخام لقائمة "بيك " للاكتئاب لدى تسع عينات كوبتية

					<u> </u>	••				
	الرتبة الميئنية									
ربات بیوت	مسنات	مسنون	موظفات	موظفون	طالبات جامعة	طلبة جامعة	طالبات ثانوى	طلبة ثانوى	الخام	
ن=157	ن=40	ن=102	ن=715	ن=694	ن=632	ن=306	ن=779	ن=350		
1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1 5	6	1 6	1	1 9	1	1 5	صفر	
1 2	1	5 7	9	10	3 5	10	5 6	5 6	1	
3	1	9	15	12	6	12	8	8	2	
1 2 3 4 5	1	16	18	18	9	15	10	10	3	
5	1	18	24	21	12	18	13	13	4	
6	1	22	30	27	18	21	15	17	5	
9	14	27	36	33	21	24	17	20	6 7	
15	15	28	39	39	24	33	20	22	8	
18	17	29	45	42	27	36	23	25	9	
24	18	34	51	45	30	45	25	27	10	
30	19	36	57	51	36	51	30	29	11	
36	20	40	63	54	39	54	33	33	12	
42	31	42	66	57	42	57	36	36	13	
51 54	61 68	45 54	69 72	61 63	45 51	60 63	40 45	39 42	14	
54 57	69	54 58	75	66	57	67	48	44	15	
63	70	60	80	69	59	69	51	46	16	
66	71	63	82	72	63	71	54	48	17	
	, .		02	, =		, .	34	-10	18	
					L					

تابع جدول (9) الرتب المئينية المقابلة للدرجات الخام لقائمة "بيك " للاكتئاب لدى تسع عينات كويتية

									1
				المئينية	الرتبة				
ربات بيوت	مسنات	مسنون	موظفات	موظفون	طالبات جامعة	طلبة جامعة	طالبات ثانوى	طلبة ثانوى	الدرجة
ن=157	ن=40	ن=102	ن=715	ن=694	ن=632	ن=306	ن=779	ن=350	الخام
69	72	67	84	74	69	73	60	51	19
72	73	69	86	76	72	75	63	53	20
74	64	72	89	78	75	78	67	58	21
78	80	73	90	80	76	81	69	64	22
81	80	76	92	81	78	84	72	66	23
84	80	78	93	82	81	86	75	68	24
85	81	79	94	84	82	87	78	72	25
85	81	81	95	85	82	89	80	74	26
86	81	83	96	86	83	91	81	76	27
90	81	85	96	87	87	93	84	78	28
91	81	87	97	87	90	94	85	81	29
91	82	88	97	88	91	95	86	83	30
92	82	89	97	89	92	96	87	84	31
92	82	90	97	91	93	97	90	85	32
92	82	91	98	92	94	98	91	86	33
93	83	93	98	92	95	98	92	88	34
93	83	94	99	93	95	98	94	90	35
94	83	95		95	96	98	95	93	36
95 95	83	95		96	96	98	96	94	37
97	83	95		97	97	98	97	94	38
98	84	95		97	98	98	98	95	39
98	84	96		98	98	98	98	96	40
98	84	97		99	99	98 99	98 99	98 99	41
98 99	84	97						99	42
99	85 85	97 97				99	99		43 44
		97 97							
	85 85	97 97							45
	85 85	97 97							46 47
	86 86	98 99							48
	86 86	99							49 50
	93								50 51
	73								31

سابعاً: الفروق بين الجنسين:

تعددت الدراسات النفسية في الكشف عن الفروق بين الذكور والاناث في الاكتئاب النفسي ، وقد تعارضت هذه الدراسات في نتائجها (انظر : بدر الانصاري 1997). ومع ذلك فان عدد الدراسات التي تثبت ارتفاع الاكتئاب لدى الاناث بالمقارنه إلى نظرائهن من الذكور (موسى ،1989؛ شقير ، 1995؛ المشعان ،1995؛ عبد الخالق ، الانصاري ، 1985؛ الانصاري Gallagher, 1983; Knight, 1984; Sowa & Lustman, 1984 ؛ 1997؛1996 وجود فروق (Ghareeb, 1987; 1990; 1991) نفوق عدد الدراسات التي تثبت عدم وجود فروق جوهرية بين الجنسين ;Ghareeb, 1983; Himmelforb, 1984; Luin,1985; Lund, 1986) (King, 1983; Himmelforb, 1984; Luin,1985; Lund, 1986).

جدول (10)
المتوسطات الحسابية (أ) والانحرفات المعيارية (ع) وقيمة "ت" لدلالة الفروق بين المتوسطات على بنود قائمة "بيك " والدرجة الكلية

مستوى الدلالة	قيمة "ت"	(2303=	الإناث(ن:	(1472=	الذكور (ن	بنود القائمة	م
		ع	م	ع	م		
_	0,03	78ر 0	77ر 0	86ر 0	77ر 0	الحزن	1
_	1,63	89ر 0	0,50	90ر 0	55ر 0	التشاؤم	3
_	0,44	81ر 0	0,56	80ر 0	57ر 0	الشعور بالفشل	4
10ر 0	79ر 1	95ر 0	97ر 0	95ر 0	91ر 0	عدم الرضا	5 6
0ر0	3,06	84ر 0	0,65	93ر 0	74ر 0	الذنب	7
0ر0	2,61	96ر 0	71ر 0	02ر 1	80ر 0	العقاب	8 9
0 ر00 و	3,54	72ر 0	0,36	84ر 0	0,46	كره الذات	10
_	1,61	96ر 0	1,02	01ر 1	07ر1	اتهام الذات	11 12
_	0,42	57ر 0	26ر 0	64ر0	27ر	أفكار انتحارية	13
0 ر	15ر 3	1,03	72ر 0	1,09	61ر 0	البكاء	14 15
_	1,59	93ر 0	97ر 0	05ر 1	91ر 0	التهيج	16
10ر	1,93	81ر 0	0,58	90ر 0	0,63	الانسحاب الاجتماعي	17
01ر	78ر 2	95ر 0	91ر 0	92ر 0	82ر0	عدم الحسم	18 19
001ر	3,98	76ر 0	0,42	85ر 0	0,52	تغير صورة الجسم	20
001ر	3,52	84ر 0	86ر 0	86ر 0	76ر 0	صعوبة العمل	21
_	23ر 0	84ر 0	84ر 0	87ر 0	83ر 0	الأرق	
001ر	4,89	89ر 0	0,99	91ر 0	84ر0	سرعة التعب	
_	0,44	84ر 0	86,0	84ر 0	66ر 0	فقد الشهيه	
_	91ر 0	92ر 0	66ر 0	99ر 0	0,69	فقد الوزن	
_	18ر 1	79ر 0	62ر 0	90ر 0	0,65	الانشغال بالجسم	
001ر	4,31	06ر 1	82ر 0	94ر 0	86ر 0	فقد اللبيدو	
	25ر 0	80ر 9	14,84	79ر 10	75ر 14	الدرجة الكلية	_

يبين جدول (10) عدم وجود فروق جوهرية بين الجنسين في الدرجة الكلية على قائمة "بيك" للاكتئاب وذلك لجميع عينات الذكور بالمقارنة بجميع عينات الاناث ، على الرغم من ظهور بعض الفروق الجوهرية بين الجنسين في بعض البنود ، حيث ارتفع متوسط الذكور بالمقارنة إلى متوسط الاناث في خمس بنود : الذنب ، العقاب ، كره الذات ، الانسحاب الاجتماعي ، تغير صورة الجسم ، على حين ارتفع متوسط الاناث بالمقارنه إلى متوسط الذكور في ست بنود هي عدم الرضا والبكاء وعدم الحسم وصعوبة العمل وسرعة التعب وفقد اللبيدو

، كما أيضا يتضح من الجدول السابق ان قيم الانحرافات المعيارية أكبر من قيم المتوسطات وربما يرجع ذلك إلى صغر مدى فئات الاجابة والذى يتراوح من 1 إلى فضلا عن تشتت الدرجات وكبر حجم العينه .

جدول (11)
المتوسطات الحسابية(م) والانحرافات المعيارية (ع) وقيم"ت" ودلالتها لمتغير الاكتئاب بين الجنسين

مستوى	قيمة"ت"	ث	إناه	J.	ذکو	المجموعات
الدلالة						
		ع	م	ع	م	
_	53ر 1	10,42	28ر 17	25ر 11	18,36	طلاب ثانوی
001ر	99ر 3	72ر 9	15,83	22ر 9	13ر 13	طلاب جامعة
001ر	19ر 5	99ر 7	03ر 11	77ر 10	67ر 13	موظفين
_	67عر	37ر 14	57ر 18	11ر11	88ر 15	مسنين
_	25ر 0	63ر 10	15,68	60ر 10	28ر 15	الكلية

ومن ناحية أخرى فقد أسفرت نتائج هذه الدراسة عن فروق جوهرية فى الاكتئاب بين طلبة وطالبات الجامعة (للمجموعة الأخيرة متوسط أعلى فى الاكتئاب) كما هو موضح فى جدول (11) ويتسق حصول الاناث على متوسط فىالاكتئاب أعلى من الذكور – بوجه عام مع نتائج عدد من الدراسات المحلية (انظر : المشعان، 1995؛ عبد الخالق، 1989؛ عبد الخالق 1996؛ الانصارى، 1996؛ 1997؛ الانصارى، 1996؛ والعربية (موسى، 1989؛ Sowa & Gallagher, 1983 ; والعالمية (Ghareeb, 1991؛ 1995؛ Lustman, 1988).

وظهر أيضا ارتفاع متوسط الاكتئاب لدى الموظفون بالمقارنه إلى الموظفات ، وتناقض هذه النتيجة نتائج العديد من الدراسات السابقة التى سبق الاشارة إليها والتى برهنت على حصول الاناث على متوسط الإكتئاب أعلى من الذكور . وبوجه عام لا ترتبط الدرجات على قائمة "بيك " للاكتئاب (الصيغة المعدلة) بالجنس بطريقة ذات معنى ، وتؤكد هذه

النتيجة معامل الارتباط بين الدرجة الكلية لقائمة " بيك " للاكتئاب والجنس (c=100) مما يشير إلى عدم وجود علاقة جوهرية بين المتغيرين . وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة بعض الدراسات King, 1983; Himmelfarb, 1984; Beck, Steer & Garbin, 1988; Beck الدراسات Steer 1993) . وإذا كانت العلاقة أكبر من c=10. فيجب على الباحث أن يقرر ما إذا كان من الضروري التحكم في هذه الخاصية أم لا ، وذلك قبل إجراء مزيد من التحليلات على قائمة " بيك " ومتغير الجنس (Beck & Steer, 1993).

ثامنا : الفروق بين الاعمار :

لا ترتبط قائمة " بيك " للاكتئاب (الصيغة المعدلة) بوجه عام بالعمر بطريقة ذات معنى (Beck & Steer 1993). ومع ذلك فهناك دراسات تورد علاقات جوهرية بين قائمة "بيك " للاكتئاب والعمر ، الا أن هذه العلاقات غير ذات معنى (غريب 1986) ، ويرتبط العمر بقائمة "بيك" المعدلة ارتباطا عكسيا (ر= -1000) في المجموعة ذات التشخيصات المختلطة (Beck & Steer 1993) . وتثبت الدراسة الحالية أن هناك أيضا علاقة جوهرية عكسيه بين قائمة "بيك" والعمر (ر=-1000) . ولكن تجدر الاشارة إلى أن هذه الدراسة قد أجريت على عينات يفترض أنها سوبة وليست مرضية .

وقد أجرى أحمد عبد الخالق وآخرون (1989) دراسة عربية في مصر بهدف بيان الفروق بين الاعمار في الاكتئاب ، واستخدمت الصيغة العربية من قائمة "بيك " للاكتئاب ، وظهر أن أكثر مجموعات الذكور اكتئابا :المسنون ، وأقلهم الموظفون . على حين كانت أكثر مجموعات الاناث اكتئابا : المراهقات والمسنات وأقلهن الموظفات . وحصل المراهقون من الجنسين على متوسط اكتئاب أعلى من مجموعة اواسط العمر . وقد أسفرت دراسة عربية أخرى أجريت على عينات مصرية (أحمد عبد الخالق ، 1996) عن وجود فروقا عمرية في الاكتئاب كما يقاس بقائمة " بيك " بين أربع مراحل عمرية هي : المراهقة ، بدايات الرشد ، أواسط العمر ، الشيخوخة وبدايات الرشد ، والمراهقه ، وأقلهم أواسط الرشد .

تثبت نتائج الدراسة الحالية أن هناك فروقاً عمرية فى الاكتئاب كما يقاس بقائمة "بيك" ويبين جدول (12) ارتفاع متوسط الاكتئاب لدى طلاب الثانوى بالمقارنة إلى طلاب الجامعة والموظفون والمسنون وربات البيوت . كما ظهر أيضا أن أكثر مجموعات الذكور اكتئابا :

المراهقون والمسنون ، وأقلهم بدايات الرشد (طلاب الجامعة) . على حين كانت أكثر مجموعات الاناث اكتئابا : المراهقات والمسنات ، وأقلهن الموظفات . وتتسق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة " أحمد عبد الخالق " (1996) بوجه عام .

جدول (12) قيم ت ودلالتها لمتغير الاكتئاب بين مجموعات الدراسة ذات الاعمار المختلفة

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
العينة الأعلى متوسطا *	مستوى الدلالة	قيمة "ت"#	المجموعات
1	0 ر00 ر0	6,42	طلبة ثانوى/طلبة جامعة
1	01ر	2,68	طانبات ثانوى/طانبات جامعة
1	001ر	6,44	طلبة ثانوى/موظفون
1	ر001	13,03	طالبات ثانوى موظفات
1	05ر	97ر 1	طلبة ثانوى/مسنون
-	-	0,34	طانبات ثانوی/مسنات
-	-	25ر 1	طالبات ثانوی/ربات بیوت
-	-	68ر 0	طلبة جامعة/ موظفون
1	J 001	82ر9	طالبات جامعة/موظفات
2	05ر	18ر 2	طلبة جامعة/مسنون
-	-	71ر	طالبات جامعة/مسنات
-	-	54ر	طانبات جامعة/ربات بيوت
2	10ر	88ر 1	موظفون/مسنون
2	10ر	96ر 1	موظفات/مسنات
2	J 001	77ر 6	موظفات /ربات بيوت
		59ر 0	ربات بيوت /مسنات
			,

[#] انظر إلى قيمة المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل عينة في جدول (8).

^{*} تشير (1) إلى المجموعات الأولى في الصف نفسه ، وتشير (2) إلى المجموعة الثانية في الصف نفسه.

تاسعا : استخداهات القائمة :

صممت قائمة "بيك " المعدله للاكتئاب لتقدير شدة الاكتئاب لدى المرضى النفسيين . وعلى الرغم من ذلك فقد استخدمت منذ سنين عديدة بوصفها أداة فرز للكشف عن وجود أعراض الاكتئاب لدى الاسوياء (أحمد عبد الخالق، 1996) . ولايزال هناك جدل محتوم حول استخدام القائمة بهدف الفرز (Beck & Steer, 1993) .

واستخدمت قائمة " بيك " للإكتئاب في بحوث عديدة ، وتشير نتائج هذه البحوث إلى أن هذه القائمة واحدة ، فقد أسفرت هذه البحوث عن معاملات ثبات وصدق مقبولة القائمة على الرغم من اختلاف الحضارات .

ونظرا لقصر القائمة (21 بنداً) فى صورتها الحالية مع عدم انخفاض معاملات ثباتها ، فانه يمكن استخدامها فى بحوث الشخصية عبر الثقافية ، والقائمة مازالت تحت الاستخدام فى عديد من الدراسات التى لم تنتهى بعد .

{ المراجع }

- 1- أحمد محمد عبد الخالق (1991) قياس الاكتئاب : مقارنة بين أربعة مقاييس . دراسة نفسية ،79 96.
- 2− أحمد محمد عبد الخالق (1993) استخبارات الشخصية ، ط2. الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية .
- 3- أحمد محمد عبد الخالق (1996) دليل تعليمات قائمة " بيك " للاكتئاب .الاسكندرية : دار المعرفة الجامعية .
- 4- أحمد محمد عبد الخالق ، بدر محمد الأنصارى (1995) التفاؤل والتشاؤم : دراسة عربية في الشخصية ، المؤتمر الثاني لمركز الارشاد النفسي بجامعة عين شمس .
- 5- أحمد محمد عبد الخالق وآخرون (1989) الفروق في القلق والاكتئاب بين مجموعات عمريه مختلفة من الجنسين . بحوث المؤتمر الخامس لعلم النفس في مصر ، القاهرة، الجمعية المصرية للدراسات النفسية، 97 –113.
- 6- بدر محمد الانصارى (1996) دراسة عامليه للحالات الانفعاليه للشباب الجامعي فى الكويت بعد العدوان العراقي . مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ، جامعة الكويت.
- 7- بدر محمد الانصارى (1997) الاكتئاب والعدوان العراقي: دراسة لمعدلات الانتشار في المجتمع الكوبتي، مكتب الانماء الاجتماعي، الديوان الأميري.
- 8- رشاد عبد العزيز موسى (1989): البنية العاملية للاكتئاب النفسي بين عينة مصرية وعينة أخرى أمريكية . مجلة علم النفس: الهيئة المصرية العامة للكتاب ،9،44، و-56.
- 9- رشاد عبد العزيز موسى (1991) سيكولوجية الفروق بين الجنسين . القاهرة : مؤسسة ممتاز .
- -10 زينب محمود شقير (1995) مفهوم الذات ومظاهر الصحة النفسية لدى المكتئبين من طلاب جامعة طنطا . مجلة علم النفس ، 33 ، -34
- 11- صفوت فرج (1991) التحليل العاملي في العلوم السلوكية ،ط2. القاهرة : الانجلو المصرية .
- 12- عويد سلطان المشعان (1995) دراسة الفروق في الإكتئاب بين المراهقين والشباب في الكوبت . المجلة التربوبة ، 37، 127 148.
- 13- غريب عبد الفتاح غريب (1985) كراسة تعليمات مقياس الاكتئاب ، القاهرة : مكتبة النهضة المصربة .

- 14- غريب عبد الفتاح غريب (1986) كراسة المعايير القومية لمقياس الاكتئاب ، القاهرة: مكتبة النهضة المصربة .
- 15-Abdullatif, I.H. (1995). Prevalence of depression among middle-school Kuwaiti students following the Iraqi invasion. Psychological Reports, 77, 643-649.
- 16-Beck, A.T. (1983). Cognitive therapy of depression: New perspectives. In. P.J. Clayton & J.E. Barrett (Eds.), Treatment of depression: Old controversies and new approaches New York: Raven Press.(pp. 32-48).
- 17-Beck, A.T. (1987) Cognitive mode of depression. Journal of Cognitive psychotherapy: An International Quarterly, 1, 5, 37.
- 18-Beck, A.T., & Freeman, A.C. (1990). Cognitive therapy of personality disorders. New York: Guilford.
- 19-Beck, A.T. & Steer, R.A (1993) *Beck Depression Inventory Manual.* San Antonio: The Psychological Corporation.
- 20-Beck. A.T., Steer, R. A. & Garbin, M. (1988) Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Twenty-five years of evaluation. Clinical Psychology Review, 8, 77-100.
- 21-Byrne, B.M., & Baron, P. (1993). The Beck Depression Inventory: Testing and cross-validating an hierarchical factor structure for nonclinical adolescents. Measurement and Development in Counseling and Development, 26, 164-178.
- 22-Byrne, B.M., & Baron, P. (1994). Measuring adolescent depression: Tests of equivalent factorial structure for English and French versions of the Beck Depression Inventory. Applied Psychology: An International Review, 43, 33-47.
- 23-Byrne, B.M., Baron, p. 8 Campbell, T.L. (1993). Measuring adolescent depression: Factorial validity and ivariance of the Beck Depression Inventory across gender. Journal of Research on Adolescence, 3, 127-143.
- 24-Byrne, B.M., Baron, P., Balev, J. (1996). The Beck Depression Inventory: Testing for its factorial validity and invariance across gender for Bulgarian non-clinical adelescents. Personality and Individual Differences, 21, 641-651.

- 25-Byrne, B.M., Baron, P., Larsson, B. & Melin, L. (1995). The Beck Depression Inventory: Testing and cross-validation of a second-order factorial structure for Swedish nonclinical adolescents. Behaviour Research Therapy, 33, 345-356.
- 26-CatanZaro, S.J. (1994). Discrimination of mood regulation expectancies from dysphoria: Cofirmator analytic findings. Journaof Assessment, 1, 53-58.
- 27-Clark, D.A. & Beck, A.T. (1989). Cognitive theory and therapy of anxiety and depression. In P.C. Kendall & D. Watson (Eds.), Anxiety and depression: Distinctive and overlapping features New York: Academic Press.(pp. 379-412).
- 28-Clark, D.A., Steer, R.A., Beck, A.T. (1994). Common and specific dimensions of self-reported anxiety and depression: Implications for the cognitive and tripartite models. Journal of Abnormal Psychology, 103, 645-654.
- 29-DeGagne, T.A., Mikail, S.F., & Deon, J.L. (1995). Confirmatory factor analysis of a 4-factor model of chronic pain evaluation pain, 60, 195-202.
- 30-Gallagher, D.E. (1983) Effects of Bereavement on indictors of mental health in elderly windows and windowers, Journal of Gerontology, 38,565-571.
- 31-Ghareeb, G.A. (1987) An investigation of some variables related to depression in Egyptian Youth Paper prestend at the Cairo Word Congress for mental heath, Wordl Federation or Mental Health Oct, 18-22.
- 32-Ghareeb. G.A. (1990) An investigation of childhood depression in United Arab Emirates Paper presented at the second U.A.E. Psychiatric Conference, Emirates Medical Association, Abu Dhabi, U.A.E. from april 30 to may2.
- 33-Ghareeb G.A (1991) The nature of adolescent depression in U.A.E. paper presented at the Royal College of Psychiatrists, Regional Meeting in Bahrain, Oct, 28-30.
- 34-Gibson, K. (1989) Children in political violence. Social Sciences & Medicine 28 (7), 659-667.
- 35-Herpest, K., & Payrel, E.S. (1989). Depression: An integrative Approach. Oxford, U.K: Heinemann Medical Books.

- 36-Himmelfarb, S. (1984) Age and sex differences in the mental health of older person. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 52,844-865.
- 37-Izard C.E., Dougherty. F.E., Bloxom, B.M., & Kotsch, W.E. (1974). The Defferential Emotion Scale: A method of measuring the supjective experiance of discrete emotion. Unpuplilished paper. Tennessee: Vendulit University.
- 38-King, S(1983) Problem definition and problem solving among the five major ethnic groups in Hawaii. Paper presented at the Annual Meeting of the International Communication Association.
- 39-Knight, R.G. (1984) Some general population norms for the short form Beck Depression Inventory. Journal of Clinical Psychology, 40,751-753.
- 40-Koper, B.A. (1993) Role of gender, sex role identity and type A behavior in anger expression and mental health functioning. Journal of Conuseling psychology, 40,232-287.
- 41-Lubin, B. (1985) Performance of bilingual subjects on Spanish and English version of the Depression Adjective Check Lists.
- 42-Lund, D.A (1986) Gender differences through two years of bereavement among the elderly . Gerontologists, 26,319-320 .
- 43-Morgan, K., et.al. (1987) . Mental health and psychological well leing among the very old living at home . British Journal of Psychiatry, 150, 801 807.
- 44-Murase, S., Murase, S., Kitabatake, M., & yamauchi, T (1995) Seasonal mood variation among Japanese residents of Stockholm .Acta psychiatrica Scandinavise, 92, 51-55.
- 45-Probest, M., Vandereycken, W., van -coppenolle, H., & vanderlinden, J. (1995). Hhe Body Attitud Test for patients with an eating disorder: Psychometric characteritics of a new questionnaire. special Issue: Body experience. Eating Disorder the Journal of Treatment and Prevention, 3, 133-144.
- 46-Pulos , S. (1996). Validity of the Beck Depression Inventory with eating disorder patiento . Educational and Psychological Measurement, 56,139-141 .

- 47-Sahin ,N., & sahin ,N. H. (1995) . Dimenisons of concerns : The case of Turkish adolescents. Journal of Adolescence, 18, 49-69 .
- 48-Salamero ,M , Marcos , T., Gutierrez, F., & Rebull, E. (1994). Factorial study of the BDI in pregnant women . Psychological Medicine, 24, 1031- 1035 .
- 49-Sowa & Lustman, PJ.(1984) Gender differences in rating stressfull events, and depressive cognition. Journal of Clinical Psychology 40,1334 1337.
- 50-TashakKori ,A., Barefoot ,J., & Mehryar ,A.H. (1989) . what does the Beck Depression Inventory measure in college student? Journal of Clinical Psychology , 45,595 602.
- 51-West , J (1982) An Arabic validation of a depression inventory .A paper prerared for the 20th Congress of Applied psychology : cross- cultual issues . University of Edinburgh, Scotland , July 25-28.